

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG (Tél. 34-14-63

ABONNEMENT ANNUEL

Poste 93)

12 NF

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Cité Administrative, 2, rue de l'Hôpital Militaire
STRASBOURG.

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

2 Mai 1961

Supplément n° 1 au Bulletin de Mai

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

Avertissement

TAVELURES

Le temps instable qui s'est installé sur nos régions a donné lieu à une série de contaminations primaires de Tavelures et des taches apparaîtront régulièrement d'une façon échelonnée au cours de la première décade de Mai, notamment dans les vergers où la protection a été insuffisante.

La formation de conidies d'été sur ces taches primaires va augmenter sensiblement les risques de dissémination de la maladie si l'on tient compte que la période de projections possibles d'ascospores n'est pas terminée. De nouvelles contaminations primaires et des repiquages sont donc à craindre au moment des précipitations.

Pour ces raisons et compte tenu du développement de la végétation, il y a lieu de maintenir la protection fongicide des arbres fruitiers à pépins en exécutant un nouveau traitement dans la période du 3 au 5 Mai.

Information

OÏDIUM

Profiter du traitement fongicide contre la Tavelure pour renouveler le traitement contre l'Oïdium. Tenir compte des indications données précédemment.

Poursuivre l'enlèvement des pousses oïdiées.

CHARANCONS PHYLLOPHAGES

On signale une activité inquiétante des différentes espèces de Charançons. Un traitement peut être opéré avec l'emploi d'un produit insecticide efficace (notamment ceux à base de Lindane, D.D.T., Aldrine, etc).

27

.../...

Très important

Dans un dernier bulletin, nous avons donné quelques indications relatives aux produits susceptibles d'être utilisés contre les Tavelures. Nous précisons que la durée d'efficacité des différentes spécialités auxquelles nous avons fait allusion n'a qu'une importance relative en période de pleine végétation, puisque de toute façon, les interventions doivent être faites à une cadence relativement soutenue en fonction même du développement des organes à protéger. On aura donc intérêt à suivre rigoureusement les indications données par les avertissements agricoles, plutôt que de vouloir opérer des traitements en fonction de la durée d'efficacité des produits. Cette efficacité est d'ailleurs théorique, puisque certains facteurs (chaleur, luminosité, etc...) peuvent la réduire sensiblement.

BETTERAVES

PUCERONS

Les premières colonies de Pucerons noirs ont été observées en de nombreuses cultures. Il semble que les pluies de ces derniers jours ont entravé le développement de ces insectes, permettant par ailleurs un développement rapide des jeunes plantes.

Le traitement insecticide contre les Pucerons noirs peut donc être différé.

CULTURES MARAICHERES

Indications concernant les limites d'emploi de certains produits insecticides :

Parathion, D.D.T., Lindane : autorisés jusqu'à 15 jours avant la récolte
Phosdrine : autorisé jusqu'à 7 jours avant la récolte

Les Contrôleurs chargés
des Avertissements Agricoles,

J. BERNARD et J.M. GRENOUILLOUX

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

J. HARRANGER

Imprimerie de la Station de Strasbourg
Cité Administrative
Directeur-Gérant : L. BOUYX